

Coliris

(référence obtenteur : Col-268gK)



Variété de cuve de la série INRA-ResDur2, à résistance polygénique au mildiou (*Rpv1 + Rpv10*) et à l'oïdium (*Run1 + Ren3 + Ren9*)



Origine / Filiation

Coliris = Bronner x Mtp 3179-90-7

Obtenteur : INRAE (France)

Bronner : Variété sélectionnée en 1999 par le Weinbau Institut de Freiburg (Allemagne). Elle porte des facteurs de résistance provenant de vignes américaines et asiatique (*V.amurensis*) et se révèle en outre bien résistante au black rot.


Mtp 3179-90-7 : Obtention INRAE, sélectionnée par A. Bouquet à Montpellier en intégrant la source de résistance *V. rotundifolia*.

Coliris a été inscrit au catalogue officiel en août 2022


Aptitudes viticoles

Phénologie

Date de débourrement (moyenne sur 3 ans)



Date de récolte (moyenne sur 3 ans)




Débourrement précoce. Maturité 1^{ère} époque, 1 semaine avant le Gamay, 2 semaines avant le Cabernet Franc.

Vigueur et production

Variété vigoureuse avec des rameaux à port semi-érigé. Coliris présente un potentiel de production élevé du fait de sa fertilité qui peut être régulé par un éclaircissage. Les grappes sont peu compactes et constituées de petites baies.

Rendement en % du témoin (moyenne sur 3 ans)




Paramètres œnologiques


Richesse en sucres et acidité des raisins

A maturité, la richesse en sucres est légèrement supérieure aux cépages témoins. L'acidité des baies se situe à un niveau intermédiaire par rapport au Cabernet Franc et au Gamay.

Titre alcoométrique potentiel (moyenne sur 3 ans)



Acidité totale en ac. sulf. (moyenne sur 3 ans)



Qualité du vin

Aptitude à l'élaboration de vins fruités, puissants et charpentés, avec une intensité colorante élevée.

Résistance aux maladies fongiques

Mildiou

Rares symptômes sur inflorescences ou grappes, sans incidence sur la récolte, alors que les cépages témoins non traités sont fortement impactés. Présences de petites nécroses sur feuillage en cas de forte pression.

Oïdium

Résistante totale, observée sur tous les sites, même en présence d'une forte pression.

Black rot

Coliris porte les facteurs de résistance *Rgb1* et *Rgb3* qui lui confère une résistance partielle limitée et insuffisante. En situation de risque, une protection fongicide est néanmoins indispensable. En l'état actuel des connaissances basées sur un petit nombre d'essais, deux traitements positionnés autour de la floraison sont suffisants pour éviter les dégâts sur grappes et les pertes de récolte.

Botrytis

Très bonne résistance à la pourriture

Economie potentielle en fongicides

Coliris est doté d'une résistance polygénique, constitué de deux facteurs de résistance au mildiou et trois facteurs de résistance à l'oïdium. Afin de préserver ces facteurs de résistance, en l'état actuel des connaissances, il est indispensable de réaliser un minimum de 2 traitements fongicides contre le mildiou et l'oïdium. Cette protection doit être modulée à la hausse en cas de forte pression de la maladie. L'économie en fongicides se situe entre 80% et 90% par rapport à une variété sensible.



Variété éligible au dispositif des Certificats d'Economie de Produits Phytopharmaceutiques (CEPP).

Remerciements :

L'acquisition des données de valeur agronomique, technologique et environnementale, synthétisées dans cette fiche, a bénéficié d'un soutien financier de FranceAgriMer dans le cadre du projet INNOVRES. La partie expérimentale a été menée au sein d'un partenariat entre INRAE, l'IFV et 2 organismes régionaux (Site 1 : l'IFV Val de Loire et Site 2 : Sicarex Beaujolais).

Renseignements :

Techniques : INRAE Colmar guillaume.arnold@inrae.fr - vincent.dumas@inrae.fr

Plants : IFV Le Grau du Roi anastasia.rocque@vignevin.com - laurent.audeguin@vignevin.com